

Quiz sui linguaggi regolari

Prof. Giorgio Gambosi

Quesito 1: Data l'espressione regolare a^* , definita su $\{a, b\}$, descrivere il linguaggio corrispondente ed elencare 5 stringhe del linguaggio stesso.

Quesito 2: Data l'espressione regolare $(ab)^*$, definita su $\{a, b\}$, descrivere il linguaggio corrispondente ed elencare 5 stringhe del linguaggio stesso.

Quesito 3: Data l'espressione regolare $a(a+b)^*a$, definita su $\{a, b\}$, descrivere il linguaggio corrispondente ed elencare 5 stringhe del linguaggio stesso.

Quesito 4: Data l'espressione regolare $(a+b)^*a(a+b)^*$, definita su $\{a, b\}$, descrivere il linguaggio corrispondente ed elencare 5 stringhe del linguaggio stesso.

Quesito 5: Data l'espressione regolare $(a(cd)^*a)^*$, definita su $\{a, b, c, d\}$, descrivere il linguaggio corrispondente ed elencare 5 stringhe del linguaggio stesso.

Quesito 6: Data l'espressione regolare $(a+b)^*ab$, definita su $\{a, b\}$, descrivere il linguaggio corrispondente ed elencare 5 stringhe del linguaggio stesso.

Quesito 7: Data l'espressione regolare $(aa)^*$, definita su $\{a, b\}$, descrivere il linguaggio corrispondente ed elencare 5 stringhe del linguaggio stesso.

Quesito 8: Data l'espressione regolare $(a^*ba^*ba^*)^*$, definita su $\{a, b\}$, descrivere il linguaggio corrispondente ed elencare 5 stringhe del linguaggio stesso.

Quesito 9: Data l'espressione regolare a^*b^* , definita su $\{a, b\}$, descrivere il linguaggio corrispondente ed elencare 5 stringhe del linguaggio stesso.

Quesito 10: Data l'espressione regolare $(ba+a)^*(b+ba)^*$, definita su $\{a, b\}$ fornire 1 stringa che non appartiene al linguaggio relativo.

Quesito 11: Data l'espressione regolare $a^*(b+aaa^*)^*a^*$, definita su $\{a, b\}$ fornire 1 stringa che non appartiene al linguaggio relativo.

Quesito 12: Definire un'espressione regolare che descriva l'insieme delle stringhe su $\{0, 1\}$ che contengono la sottostringa 000.

Quesito 13: Definire un'espressione regolare che descriva l'insieme delle stringhe su $\{0, 1\}$ che non contengono la sottostringa 000.

Quesito 14: Definire un'espressione regolare che descriva l'insieme delle stringhe su $\{0, 1\}$ che contengono la sottostringa 000, ma non come caratteri iniziali.

Quesito 15: Definire un'espressione regolare che descriva l'insieme delle stringhe su $\{0, 1\}$ che contengono la sottostringa 000, ma non all'inizio né alla fine.

Quesito 16: Definire un'espressione regolare che descriva l'insieme delle stringhe su $\{0, 1\}$ che contengono esattamente tre caratteri 0

Quesito 17: Definire un'espressione regolare che descriva l'insieme delle stringhe su $\{0, 1\}$ che contengono al più tre caratteri 0

Quesito 18: Definire un'espressione regolare che descriva l'insieme delle stringhe su $\{0, 1\}$ che contengono almeno tre caratteri 0

Quesito 19: Definire un'espressione regolare che descriva l'insieme delle stringhe su $\{0, 1\}$ che iniziano e terminano con due caratteri diversi.

Quesito 20: Definire un'espressione regolare che descriva l'insieme delle stringhe su $\{0, 1\}$ che contengono un numero dispari di 0

Quesito 21: Definire un'espressione regolare che descriva l'insieme delle stringhe su $\{0, 1\}$ che contengono un numero pari di 0

Quesito 22: Definire un'espressione regolare che descriva l'insieme delle stringhe su $\{0, \dots, 9\}$ che rappresentano interi divisibili per 5

Quesito 23: Definire un'espressione regolare che descriva l'insieme delle stringhe su $\{a, b, c\}$ che contengono un numero di caratteri a pari a $4k + 1$, per qualche $k \geq 0$.

Quesito 24: Definire un'espressione regolare che descriva l'insieme delle stringhe su $\{a, b, c\}$ di lunghezza pari a $3k$, per qualche $k \geq 0$.

Quesito 25: Definire un'espressione regolare che descriva l'insieme delle stringhe su $\{a, b, c\}$ contenenti un numero di caratteri c pari a $3k$, per qualche $k \geq 0$.

Quesito 26: Definire un'espressione regolare che descriva l'insieme delle stringhe su $\{a, b, c\}$ contenenti 2 caratteri a o 3 caratteri b .

Quesito 27: Definire un'espressione regolare che descriva l'insieme delle stringhe su $\{a, b, c\}$ contenenti 2 caratteri a e 3 caratteri b .

Quesito 28: Mostrare che le seguenti espressioni regolari definiscono linguaggi diversi. $E_1 = ab + c^*$, $E_2 = (ab + c)^*$, $E_3 = a(b + c)^*$

Quesito 29: Definire espressioni regolari per i seguenti linguaggi sull'alfabeto $\{a, b\}$.

1. Il linguaggio di tutte le stringhe che contengono almeno tre a .
2. Il linguaggio di tutte le stringhe che iniziano e terminano con lo stesso simbolo.
3. Il linguaggio di tutte le stringhe aventi sia ab che ba come sottostringhe.

Quesito 30: Per una qualunque stringa $w = a_1a_2 \dots a_n$, la stringa inversa w^R di w è la stringa w in ordine inverso, $a_n \dots a_2a_1$. Per un qualunque linguaggio L , sia $L^R = \{w^R \mid w \in L\}$ il linguaggio composto dalle inverse delle stringhe in L .

1. Dimostrare che se L è regolare, anche L^R è regolare.
2. Sia dato l'alfabeto

$$\Sigma_3 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Σ_3 contiene tutte le colonne di 3 elementi aventi valore 0 o 1. Una stringa di simboli di Σ_3 corrisponde a tre righe di 0 e 1. Si consideri ogni riga come un numero espresso in notazione binaria, e sia

$$B = \{w \in \Sigma_3^* \mid \text{la riga inferiore di } w \text{ rappresenta la somma delle due righe superiori}\}.$$

Mostrare che B è regolare. (Traccia: Usare il primo punto nel problema).

Quesito 31: Si considerino i linguaggi $L_1 \subseteq \{0, 1\}^*$, comprendente tutte e sole le stringhe contenenti il simbolo 0 in ogni posizione pari ad un multiplo di 3 (0,3,6,9,...), ed $L_2 \subseteq \{0, 1\}^*$, l'insieme delle stringhe aventi almeno 3 caratteri. Mostrare che il linguaggio $L = L_1 \circ L_2$ è regolare.

Quesito 32: Sia dato un linguaggio $L \subseteq \Sigma^*$. Sia $estraiCarattere(L)$ il linguaggio composto da tutte le stringhe che possono essere ottenute eliminando un simbolo da una qualche stringa in L . Sia cioè $estraiCarattere(L) = \{xz \mid xaz \in L \text{ dove } x, z \in \Sigma^*, a \in \Sigma\}$. Mostrare che la classe dei linguaggi regolari è chiusa rispetto all'operazione $estraiCarattere$. (Traccia: Dato l'ASFD che riconosce L costruire un ASFD che riconosce $estraiCarattere(L)$)

Quesito 33: Definire le espressioni regolari che descrivono i seguenti linguaggi. Si intende che l'alfabeto è $\{0, 1\}$.

1. $L_1 = \{w \mid w \text{ contiene la stringa } 0101\}$

2. $L_2 = \{w \mid w \text{ non contiene la stringa } 100 \text{ come sottostringa}\}$
3. $L_3 = \{w \mid w \text{ inizia con } 0 \text{ e ha lunghezza dispari, o inizia con } 1 \text{ e ha lunghezza pari}\}$
4. $L_4 = \{w \mid w \text{ ha al più } 5 \text{ caratteri}\}$
5. $L_1 = \{w \mid w \neq \varepsilon\}$

Quesito 34: Siano r_1 e r_2 due espressioni regolari. Dimostrare se le seguenti proprietà sono vere o false:

1. $L(r_1^*r_1^*) = L(r_1^*)$
2. $L((r_1 + r_2)^*r_1^*) = L((r_1 + r_2)^*)$
3. $L((r_1r_2)^*) = L(r_1^*r_2^*)$

Quesito 35: Siano r_1 e r_2 due espressioni regolari. Dimostrare se le seguenti proprietà sono vere o false:

1. $L(r_1^*r_1^*) = L(r_1^*)$
2. $L((r_1 + r_2)^*r_1^*) = L((r_1 + r_2)^*)$
3. $L((r_1r_2)^*) = L(r_1^*r_2^*)$

Quesito 36: Siano r_1 e r_2 due espressioni regolari. Dimostrare se le seguenti proprietà sono vere o false:

1. $(r_1r_2 + r_1)^*r_1r_2 = (r_1r_1^*r_2)^*$
2. $(r_1r_2 + r_1)^*r_1 = r_1(r_2r_1 + r_1)^*$

Quesito 37: Usare il *pumping lemma* e le proprietà di chiusura della classe dei linguaggi regolari per mostrare che i seguenti linguaggi non sono regolari.

1. $L_1 = \{0^a1^b2^c \mid 0 \leq a \leq b \leq c\}$
2. $L_2 = \{a^{2^n} \mid n \geq 0\}$
3. $L_3 = \{0^{n^2} \mid n \geq 0\}$
4. $L_4 = \{0^n1^m0^n \mid m, n \geq 0\}$
5. $L_5 = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ non è palindroma}\}$
6. $L_6 = \{a^n b^m \mid n < l + 3, n, l \geq 0\}$
7. $L_7 = \{wwww \mid w \in \{a, b\}^*\}$
8. $L_8 = \{a^n \mid k = \sqrt{n}, \text{ con } n, k \text{ interi e } n, k \geq 1\}$

Quesito 38: Definire grammatiche regolari per i seguenti linguaggi

1. $L_1 = L((ab^*aaab^*a)^* + (bba^*b))$
2. $L_2 = \{a^n b^m \mid n + m = 2k, n, m, k \geq 0\}$

Quesito 39: Sia $\Sigma = \{0, 1, +, =\}$ e sia $ADD = \{x = y+z \mid x, y, z \text{ sono interi in notazione binaria, e } x \text{ è la somma di } y, z\}$. Mostrare che ADD non è regolare.

Quesito 40: Sia L un linguaggio su $\{a, b\}$ tale che per ogni stringa $w \in L$:

1. w non contiene coppie di a adiacenti
2. ogni b in w è adiacente ad un'altra b
3. $|w|$ è pari.

Dimostrare che L è regolare.

Quesito 41: Dimostrare che il linguaggio $L = \{a^n b^m \mid n \leq m\}$ non è regolare.

Quesito 42: Dimostrare che il linguaggio $L = \{a^n b^{2n}\}$ non è regolare.

Quesito 43: Illustrare come sia possibile verificare, date due espressioni regolari r_1 e r_2 , se esse definiscono lo stesso linguaggio. Mostrare come tale procedimento possa essere applicato per verificare che $a^*(ab+ba)^*b$ e $a^*b(a+ab)^*b^*$ non definiscono uno stesso linguaggio.

Quesito 44: Il linguaggio $\{a^i b^j \mid i + j \geq 4\}$ è regolare? Dimostrare la propria risposta.

Quesito 45: Il linguaggio $\{a^i b^j \mid i - j \geq 4\}$ è regolare? Dimostrare la propria risposta.

Quesito 46: Dimostrare che le espressioni regolari $r_1 = ab + c^*$, $r_2 = (ab + c)^*$, $r_3 = a(b + c)^*$ descrivono linguaggi diversi.

Quesito 47: Sia dato l'ASFND \mathcal{A} con $\Sigma = \{0, 1\}$, $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, $F = \{q_3\}$ e δ definita dalla tabella seguente:

	q_0	q_1	q_2	q_3
0		q_1	q_3	
1		$\{q_1, q_2\}$	q_3	
ε	$\{q_1, q_3\}$			

Derivare una espressione regolare che descriva il linguaggio accettato da \mathcal{A}

Quesito 48: Per ognuna delle seguenti proposizioni, dire se è vera o falsa, giustificando obbligatoriamente la risposta data.

1. Se L è un linguaggio regolare allora ogni $L' \subseteq L$ è regolare
2. Se L e L' sono linguaggi regolari allora $L - L'$ è regolare
3. 11000 appartiene al linguaggio $0^*1(11)^*10^*$
4. 01110 appartiene al linguaggio $0^*1(11)^*10^*$

Quesito 49: Dimostrare che il linguaggio $L = \{a^i b^j \mid i < j\}$ non è regolare.

Quesito 50: Fornire le espressioni regolari che descrivono i seguenti linguaggi.

1. $L = \{a^{2i} \mid i > 0\}$
2. $L = \{\sigma \mid \sigma \text{ contiene esattamente 2 caratteri } a\}$
3. $L = \{\sigma \mid \sigma \text{ contiene un numero pari di caratteri } a\}$
4. $L = \{\sigma \mid \sigma \text{ contiene un numero dispari di caratteri } a\}$

Quesito 51: Sia dato l'ASFD \mathcal{A} con $\Sigma = \{0, 1\}$, $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, $F = \{q_2\}$ e δ definita dalla tabella seguente:

	q_0	q_1	q_2
0	q_0	q_2	q_0
1	q_1	q_1	q_1

Derivare una espressione regolare che descriva il linguaggio $L(\mathcal{A})$ riconosciuto dall'automa.

Quesito 52: Dimostrare che il linguaggio $L = \{a^n b^m c^n \mid n, m > 0\}$ non è regolare.

Quesito 53: Sia dato il linguaggio $L = \{\sigma \in \{a, b, c\}^* \mid \#a(\sigma) = \#b(\sigma) = \#c(\sigma)\}$, dove $\#x(\sigma)$ indica il numero di caratteri x nella stringa σ . Il linguaggio L è regolare? Dimostrare la risposta data.

Quesito 54: Data l'espressione regolare $r = a(b^* + a)$, derivare un automa a stati finiti deterministico che riconosca il linguaggio $L(r)$.

Quesito 55: Si consideri il linguaggio $L = \{a^r b^s c^t \mid t = r - s\}$. Dimostrare che questo linguaggio non è regolare.

Quesito 56: Dimostrare che il seguente linguaggio è regolare $L = \{a^k b^j c^i \mid i, j, k > 0\}$ dove k è dispari e $i > 2$, oppure j è dispari e $i \leq 3$.

Quesito 57: Si definisca una grammatica di tipo 3 che generi il linguaggio $L = \{x0y \mid x \in \{0, 1\}^*, y \in \{0, 1\}^3\}$.

Quesito 58: Sia dato il linguaggio

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ non è della forma } vv\}$$

Mostrare se L è regolare o meno.

Quesito 59: Si definisca una grammatica di tipo 3 che generi il seguente linguaggio

$$L = \{a^n b^m c^k \mid n + m + k \text{ dispari}\}$$

Quesito 60: Definire una grammatica regolare che generi il seguente linguaggio

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* : w \text{ non contiene la sottostringa } 101\}$$

descrivendo e giustificando le scelte effettuate.

Quesito 61: Si determini se i linguaggi

$$L = \{a^i b^j c^i \mid i, j \geq 1\}$$

e

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0\}$$

sono regolari.

Quesito 62: Definire una grammatica di tipo 3, priva di simboli inutili, che generi il linguaggio descritto dall'espressione regolare $a^* b c^* + a(ab + c^* b)$

Quesito 63: Si definisca una grammatica regolare che generi il linguaggio L composto da tutte le stringhe su $\Sigma = \{a, b\}$ non contenenti la sequenza aba